

Fixní kombinační léčba hypertenze

J. Špinar¹, J. Vítovec², L. Špinarová²

¹ Interní kardiologická klinika LF MU a FN Brno

² I. interní kardiologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně

Souhrn

Podáváme přehled současných názorů na postavení fixních kombinací v léčbě hypertenze podle doporučení ESH/ESC a ČSH z roku 2013. Mezi nejčastěji doporučované dvojkombinace patří blokátor renin angiotenzinového systému (ACEI nebo sartan) a blokátor vápníku, dále blokátor renin-angiotenzinového systému a diuretikum a blokátor vápníku a diuretikum. V roce 2014 se na českém trhu objevila fixní kombinace ACE inhibitor (perindopril), blokátor vápníku (amlodipin) a diuretikum (indapamid). Výhoda fixních kombinací je především ve větší complianci nemocného, a tím v lepší kontrole hypertenze. Trojkombinaci k dobré kontrole tlaku potřebuje asi jedna třetina hypertoniků.

Klíčová slova

hypertenze – fixní kombinace – trojkombinace

Fixed-dose combination therapy for hypertension

Abstract

We present an overview of current opinions on the position of fixed-dose combinations in the treatment of hypertension in line with the ESH/ESC and the Czech Society for Hypertension guidelines of 2013. The most frequently recommended double combinations are a renin angiotensin system inhibitor (ACE-I or sartan) plus a calcium antagonist, a renin angiotensin system inhibitor plus a diuretic, or a calcium antagonist plus a diuretic. A fixed-dose combination of an ACE inhibitor (perindopril), a calcium channel blocker (amlodipine) and a diuretic (indapamide) was introduced in the Czech market in 2014. The main advantage of fixed combinations is improved patient compliance, leading to a better control of hypertension. A triple combination is required for good control of hypertension in about one third of patients.

Keywords

hypertension – fixed-dose combination – triple combination

Arteriální hypertenze svou vysokou prevalencí v dospělé populaci v průmyslově vyspělých zemích (20–50 %) představuje závažný zdravotní problém [1–3]. Zároveň je spolu s kouřením, diabetem, dyslipidemií a obezitou (zejména abdominální) i jedním z nejzávažnějších rizikových faktorů cévních mozkových příhod (CMP), ischemické choroby srdeční (IČHS) a ischemické choroby tepen dolních končetin (IČHDK). Vztah mezi výškou krevního tlaku (TK) a výskytem KV komplikací je téměř lineární [1,2].

Prevalence hypertenze v ČR v dospělé populaci ve věku 25–64 let se pohybuje kolem 35 % se zřetelným nárůstem ve vyšších věkových skupinách. Tyto údaje vycházejí ze screeningového vyšetření náhodně vybraného reprezentativního vzorku populace. Průzkumy v letech 1997–2007 nárůst kombinační léčby hypertenze v ČR potvrzují (obr. 1) [4] a podobný trend je i ve světě (obr. 2) [5]. **Trojkom- binaci k dosažení cílového TK dle těchto průzkumů potřebuje asi jedna třetina hyper-**


per-toniků, což dokazují i data o použití trojkombinací z klinických studií (obr. 3) [5–7].

Příznivý vliv antihypertenzní léčby na koronární a cerebrovaskulární morbiditu a mortalitu byl prokázán jak u pokročilých forem hypertenze, tak u mírné hypertenze a od počátku 90. let 20. století i u hypertenze ve vyšším věku a izolované systolické hypertenze starších osob [8,9]. V léčbě hypertenze využíváme jak léčby farmakologické, tak i léčby nefarmakologické. Léčbu vyžaduje i hypertenze starších osob nad 65 let a izolovaná systolická hypertenze. V současné době neexistují přesvědčivé důkazy o profitu z farmakologické léčby hypertenze u pacientů starších 80 let. Pokud však byla antihypertenzní léčba zahájena již dříve, léčbu po dosažení 80. roku věku u spolupracujících osob nepřerušujeme [10].


Léčbu hypertenze lze zahájit monoterapií, obvykle v nízké dávce, nebo kombinací dvou léků v nízké dávce či fixní kombinací [1,2]. Monoterapie hypertenze bývá úspěšná maximálně u 30 % nemocných. U ostatních dosa-

hujeme normalizace TK kombinací dvou i více antihypertenziv. Nová evropská a česká doporučení taktéž udávají jasnou definici rezistentní hypertenze.

Rezistentní hypertenze je definována jako přetrvávající TK \geq 140/90 mm Hg navzdory podávání nejméně trojkombinace antihypertenziv vč. diuretik v maximálních tolerovaných dávkách. Nejčastěji se jedná o pseudorezistenci při špatné adherenci nemocného k léčbě. Skutečná rezistence je často spojena s diabetes mellitus 2. typu (DM2) a obezitou. Může se jednat o sekundární hypertenzi, nejčastěji při primárním hyperaldosteronismu nebo při obstrukční spánkové apnoe, může být také vyvolána současným podáváním léků zvyšujících TK, expanzí volumu při renální insuficienci nebo při vysokém přívodu soli. Při skutečné rezistenci klademe důraz na podávání diuretika v maximální tolerované dávce, neboť nemocný je často vynechává; další léky volíme podle konkrétní klinické situace. Optimální je minimalizovat



Obr. 1. Antihypertenzní léčba v České republice.



Obr. 2. Antihypertenzní léčba ve světě.

počet užívaných tablet a používat fixní kombinace antihypertenziv [1].

Základní skupiny antihypertenziv představují ACE inhibitory (ACEI), antagonisté receptoru AT1 pro angiotenzin II (sartany), dlouhodobě působící blokátory kalciových kanálů (BKK), diuretika a betablokátory. U těchto skupin léčiv byl prokázán nejen výborný antihypertenzní účinek, ale rovněž významné snížení KV a cerebrovaskulární mortality.


Kombinovaná léčba antihypertenzivy s odlišným (a vzájemně se doplňujícím) mechanismem působení je považována za nejvýhodnější strategii při nedostatečné kontrole hypertenze. Doporučené dvojkombinace dle guidelines České společnosti pro hypertenzi ukazuje obr. 4. Dle těchto doporučení je za nejvýhodnější trojkombinaci považován blokátor RAAS (ACEI či sartany), BKK (především dihydro-

pyridiny) a diuretikum (thiazidové či indapamid).


Díky aditivnímu antihypertenznímu efektu, který je provázen menším množstvím nežádoucích účinků, tuto strategii upřednostňujeme před podáváním jednoho léčiva ve vysoké dávce. V důkladné metaanalýze 42 studií bylo dokonce prokázáno, že léčba dvojkombinací antihypertenziv základních skupin je přibližně pětikrát účinnější než zdvojnásobení dávky jednoho léčiva [5]. Metaanalýza Bangaloreho et al pak prokázala, že podávání léků ve fixní kombinaci je asi 1,5krát účinnější než podávání stejných léků v jednotlivých tabletách [11].

Nejvíce preferovanou kombinací je současné podávání BKK a ACEI. U kombinace sartanu s BKK nemáme data z prospektivní studie, ale předpokládá se podobný efekt. Kombinace ACEI/sartanu s diuretikem je vysoce účinná a lze ji použít např. u hypertenze ve stáří nebo u diabetiků (zde volíme indapamid). BKK a diuretika jsou lékové skupiny s příbuznými vlastnostmi, takže jejich aditivní antihypertenzní účinek nebyl předpokládán, přesto byla tato kombinace úspěšně použita v několika velkých studiích.


Potřeba užívat větší počet farmak může přispívat k nedostatečné adherenci k léčbě – zejména u starších osob s četnými komorbiditami. Jelikož byla v léčbě hypertenze jasně prokázána pozitivní korelace mezi adherencí k léčbě a kontrolou onemocnění, je nutné do managementu tohoto onemocnění zahrnout všechny intervence, které adherenci zvy-



Obr. 3. Antihypertenzní léčba v klinických studiích.



Obr. 4. Doporučené dvojkombinace podle guidelines České společnosti pro hypertenzi.



Obr. 5. Mechanismus účinku ACE inhibitorů na snížení otoků po kalciových blokátorech.

šují. Jednou z cest, jak lze adherenci k léčbě chronických onemocnění podpořit, je podávání fixních kombinací léčiv v jedné tabletě. Adherence k léčbě je nepřímo úměrná počtu antihypertenziv, která pacienti užívají, a počtu denních dávek léku. Při nutnosti užívat tři léky je udávána compliance kolem 60 %, při užívání jednoho léku kolem 80 %. Jest-

liže tedy budeme užívat fixní kombinaci tří léků v jedné tabletě, zvýšíme complianci asi o 20 % [12,13].

Kombinační léčbu dvěma antihypertenzivy v nižších dávkách anebo fixní kom-

binací upřednostňujeme při zahajování farmakologické léčby, pokud iniciální hodnoty TK jsou ≥ 160 a/nebo ≥ 100 mm Hg.

Vhodné a doporučené dvojkombinace jsou (dle ČSH a ESC guidelines):

Tab. 1. Fixní kombinace ACE inhibitorů a dihydropyridinů dostupné na českém trhu.

| ACE inhibitory + dihydropyridiny | | | |
|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Kombinace | Firemní název | Obsah | Držitel registrace |
| enalapril + lercanidipin | Elnap 10 mg/10 mg | enalapril 10 mg + lercanidipin 10 mg | Krka |
| | Amesos 10 mg/5 mg | lisinopril 10 mg + amlodipin 5 mg | Gedeon Richter |
| lisinopril + amlodipin | Amesos 20 mg/5 mg | lisinopril 20 mg + amlodipin 5 mg | Gedeon Richter |
| | Amesos 20 mg/10 mg | lisinopril 20 mg + amlodipin 10 mg | Gedeon Richter |
| perindopril + amlodipin | Amlessa 4 mg/5 mg | perindopril 4 mg + amlodipin 5 mg | Krka |
| | Amlessa 8 mg/5 mg | perindopril 8 mg + amlodipin 5 mg | Krka |
| | Amlessa 8 mg/10 mg | perindopril 8 mg + amlodipin 10 mg | Krka |
| | Perindopril/amlodipin teva 5/5 mg | perindopril 5 mg + amlodipin 5 mg | Teva |
| | Perindopril/amlodipin teva 5/10 mg | perindopril 5 mg + amlodipin 10 mg | Teva |
| | Perindopril/amlodipin teva 10/5 mg | perindopril 10 mg + amlodipin 10 mg | Teva |
| | Prestance 5 mg/5 mg | perindopril 5 mg + amlodipin 5 mg | Servier |
| | Prestance 5 mg/10 mg | perindopril 5 mg + amlodipin 10 mg | Servier |
| | Prestance 10 mg/5 mg | perindopril 10 mg + amlodipin 5 mg | Servier |
| | Prestance 10 mg/10 mg | perindopril 10 mg + amlodipin 10 mg | Servier |
| | Tonarssa 4 mg/5 mg | perindopril 4 mg + amlodipin 5 mg | Krka |
| | Tonarssa 4 mg/10 mg | perindopril 4 mg + amlodipin 10 mg | Krka |
| | Tonarssa 8 mg/5 mg | perindopril 8 mg + amlodipin 5 mg | Krka |
| | Tonarssa 8 mg/10 mg | perindopril 8 mg + amlodipin 10 mg | Krka |
| | Vidonorm 4 mg/5 mg | perindopril 4 mg + amlodipin 5 mg | Gedeon Richter |
| | Vidonorm 4 mg/10 mg | perindopril 4 mg + amlodipin 10 mg | Gedeon Richter |
| | Vidonorm 8 mg/5 mg | perindopril 8 mg + amlodipin 5 mg | Gedeon Richter |
| | Vidonorm 8 mg/10 mg | perindopril 8 mg + amlodipin 10 mg | Gedeon Richter |
| ramipril + amlodipin | Egiramlon 5 mg/5 mg | ramipril 5 mg + amlodipin 5 mg | Egis |
| | Egiramlon 5 mg/10 mg | ramipril 5 mg + amlodipin 10 mg | Egis |
| | Egiramlon 10 mg/5 mg | ramipril 10 mg + amlodipin 5 mg | Egis |
| | Egiramlon 10 mg/10 mg | ramipril 10 mg + amlodipin 10 mg | Egis |
| | Piramil combi 5 mg/5 mg | ramipril 5 mg + amlodipin 5 mg | Sandoz |
| | Piramil combi 5 mg/10 mg | ramipril 5 mg + amlodipin 10 mg | Sandoz |
| | Piramil combi 10 mg/5 mg | ramipril 10 mg + amlodipin 5 mg | Sandoz |
| | Piramil combi 10 mg/10 mg | ramipril 10 mg + amlodipin 10 mg | Sandoz |
| | Ramomark 5 mg/5 mg | ramipril 5 mg + amlodipin 5 mg | Adamed |
| | Ramomark 5 mg/10 mg | ramipril 5 mg + amlodipin 10 mg | Adamed |
| ramipril + felodipin | Triasyn 2,5/2,5 mg | felodipin 2,5 mg + ramipril 2,5 mg | Sanofi-Aventis |
| | Triasyn 5/5 mg | felodipin 5 mg + ramipril 5 mg | Sanofi-Aventis |

- blokátor RAAS (ACEI nebo sartan) a dlouhodobě působící BKK ze skupiny dihydropyridinů,
- blokátor RAAS (ACEI nebo sartan) a diuretikum thiazidového typu nebo indapamid.

Blokátory RAAS/blokátory vápníkových kanálů

Kombinační terapie blokátory RAAS s BKK se v poslední době ukazuje jako obzvlášť výhodná [14]. Je to především díky kardio-

protektivním a renoprotektivním účinkům a metabolické neutralitě, které se ukázaly při srovnání s jinými dvojkombinacemi antihypertenziv. Blokátory RAAS tlumí aktivaci sympatiku a aktivaci RAAS, kterou vyvolávají BKK.

Tab. 2. Fixní kombinace sartanů a dihydropyridinů dostupné na českém trhu.

| Sartany + dihydropyridiny | | | |
|---------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Kombinace | Firemní název | Obsah | Držitel registrace |
| telmisartan + amlodipin | Twynsta 40 mg/5 mg | telmisartan 40 mg + amlodipin 5 mg | Boehringer Ingelheim |
| | Twynsta 80 mg/10 mg | telmisartan 80 mg + amlodipin 10 mg | Boehringer Ingelheim |
| candesartan + amlodipin | Caramlo 8 mg/5 mg | candesartan 8 mg + amlodipin 5 mg | Zentiva |
| | Caramlo 16 mg/10 mg | candesartan 16 mg + amlodipin 10 mg | Zentiva |

Blokátory RAAS (především ACEI) navíc snižují riziko periferních otoků, což jsou typické nežádoucí účinky BKK (závislé na dávce). Toto snížení otoků je snadno vysvětlitelné tak, že dihydropyridin dělá prekapilární vazodilataci, z čehož mohou vzniknout otoky neodstranitelné diuretiky. ACEI dělá postkapilární vazodilataci, což usnadní odtok krve a minimalizuje otoky (obr. 5).

Přínosy kombinace ACEI s BKK dihydropyridinového typu se ukázaly v menších studiích FACET (fosinopril/amlodipin), CAMELOT (enalapril/amlodipin) a ANDI (quinapril/amlodipin) [15–17]. Ve velké mezinárodní randomizované studii ASCOT-BPLA byla zjištěna vyšší účinnost kombinace perindopril/amlodipin ve srovnání s léčbou kombinací atenolol/bendroflumethazid; relativní riziko rozvoje diabetu bylo sníženo dokonce téměř o třetinu [18,19]. Další významná randomizovaná studie ACCOMPLISH prokázala superioritu kombináční léčby benazepril/amlodipin nad kombinací benazepril/hydrochlorothiazid u hypertoniků s vysokým KV rizikem [20]. Byla ukončena předčasně po třech letech, protože kombinace s amlodipinem byla statisticky významně účinnější v prevenci KV příhod. Tato léčba rovněž výrazněji zpomalovala progresi nefropatie [21]. U nás jsou dostupné fixní kombinace ACEI s amlodipinem, felodipinem a lercanidipinem (tab. 1) a kombinace telmisartan + amlodipin či candesartan + amlodipin (tab. 2).

Blokátory RAAS/diuretika

Mechanismy účinku těchto dvou lékových skupin se vhodně doplňují. Blokátory RAAS kompenzují zvýšení plazmatické aktivity reninu, které je vyvoláno diuretiky. Vylučování solí způsobené diuretiky rovněž přispívá k antihypertenznímu působení blokátorů RAAS. Blokátory RAAS navíc tlumí nežádoucí účinky diuretik – upravují elektrolytovou nerovnováhu (zejména hypokalemii) a kompenzují metabolická rizika (hyperglykemii). U nás jsou ve

fixní kombinaci s diuretiky dostupné jak ACEI, tak sartany (tab. 3, 4). Diuretickou složkou bývá hydrochlorothiazid nebo indapamid.

V roce 2011 Vark et al publikovali metaanalýzu studií u hypertenze, ze které byl závěr, že pouze léčba založená na ACEI (konkrétně na perindoprilu) snižuje mortalitu, a to pokud je v kombinaci s indapamidem nebo s amlodipinem (obr. 6) [22,23].

Perindopril + indapamid byl použit např. ve studiích PROGRESS, ADVANCE a HYVET. Podávání kombinace perindopril/indapamid populaci diabetiků s vysokým KV rizikem se ukázalo velmi výhodné ve velké randomizované studii ADVANCE [24]. V této studii byl snížen výskyt primárního cíle (závažných makrovaskulárních a mikrovaskulárních příhod) o 9 % ($p = 0,041$). KV mortalita byla snížena dokonce o 18 % ($p = 0,027$).

Sartan a hydrochlorothiazid byly použity např. ve studiích LIFE a SCOPE, kde byl prokázán jejich dobrý efekt. Ve studii LIFE byla kombinace losartan + hydrochlorothiazid významně účinnější než kombinace atenolol + hydrochlorothiazid.

Blokátory kalciových kanálů/diuretika

Tato kombinace byla použita s dobrým efektem ve studiích FEVER, ELSA a VALUE. Ve studii SYST EUR snížila aktivní léčba hypertenze nitrendipinem (případně kombinací antihypertenziv – přidáván enalapril nebo hydrochlorothiazid) celkový počet CMP o 42 %, nefatální CMP byly dokonce sníženy o 44 %. Nově se doporučuje i kombinace BKK + indapamid. Fixní kombinace není v ČR registrována žádná.

Fixní dvojkombinace

Veškeré poznatky ukazují, že použití fixních kombinací má četné výhody. Fixní kombinace mohou být první krok v léčbě hypertenze a/nebo navazují ihned na monoterapii, je-li tato nedostatečně účinná. Prokázané účinné fixní dvojkombinace jsou: ACEI + diu-

retikum, All blokátor + diuretikum, BKK + diuretikum, ACEI + BKK, All blokátor + BKK a dihydropyridin + betablokátor [25,26].

Zajímavá data přinesla velká retrospektivní kohortová studie, která zahrnuje více než sedm tisíc pacientů s hypertenzí. Vyšší adherence byla zjištěna ve skupině pacientů léčených fixní dvojkombinací antihypertenziv než u těch, kteří změnili léčebný režim na podávání obou léčiv samostatně. Pokračování v léčbě fixní kombinací bylo spojeno s lepší perzistencí (o 43 %; $p < 0,002$). Compliance byla rovněž zvýšena (o 22 %; $p < 0,001$). Tyto rozdíly se promítly do zdravotnických nákladů spojených s léčbou hypertenze. Autoři odhadují ovlivnění nákladů při použití fixní kombinace na 5% redukcii ($p < 0,001$) [11,27].

Na našem trhu je dostupná řada fixních kombinací s obsahem dvou antihypertenziv s různým mechanismem účinku, z nichž většina obsahuje diuretikum. Naprostá většina těchto přípravků je určena k podávání jednou denně. Buď přímo umožňují farmakologické vlastnosti obsažených léčiv (častěji), nebo je toto dávkování zajištěno pomocí technologie řízeného uvolňování léčiv. Dostupné fixní kombinace antihypertenziv jsou schematicky znázorněny v tab. 1–4.

Trojkombinace antihypertenziv

Evropská, česká i americká doporučení uvádějí jako vhodnou trojkombinaci antihypertenziv blokátor RAAS, dihydropyridin a diuretikum [1,2,28].

Česká doporučení udávají: „U těžké hypertenze je nutné podávat nejméně **trojkombinaci**, mnohdy i kombinaci **čtyř až sedmi antihypertenziv**. Tuto léčbu vyžaduje minimálně 20 % hypertoniků. Měla by být vyloučena sekundární hypertenze. Vždy má být zastoupeno diuretikum. Za trojkombinací s nejširším použitím je považováno podávání ACEI/AT1 blokátoru, BKK a diuretika.“ [1].

Americká doporučení z roku 2014 udávají: „Pokud není dosaženo kontroly TK se dvěma léky, přidejte a titrujte třetí lék (chybějící ze

Tab. 3. Fixní kombinace ACE inhibitorů a diuretik.

| ACE inhibitory + diuretika | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------|
| Kombinace | Firemní název | Obsah | Držitel registrace |
| cilazapril + hydrochlorothiazid | Cazacombi 5 mg/12,5 mg | cilazapril 5 mg + HCHT 12,5 mg | Krka |
| | Inhibace plus | cilazapril 5 mg + HCHT 12,5 mg | Roche |
| enalapril + hydrochlorothiazid | Berlipril h 10 mg/25 mg | enalapril 10 mg + HCHT 25 mg | Berlin-Chemie |
| | Enap-h | enalapril 10 mg + HCHT 25 mg | Krka |
| | Enap-hl | enalapril 10 mg + HCHT 12,5 mg | Krka |
| fosinopril + hydrochlorothiazid | Monace combi 20 mg/12,5 mg | fosinopril 20 mg + HCHT 12,5 mg | PharmaSwiss |
| lisinopril + hydrochlorothiazid | Diroton plus h 10 mg/12,5 mg | lisinopril 10 mg + HCHT 12,5 mg | Gedeon Richter |
| | Diroton plus h 20 mg/12,5 mg | lisinopril 20 mg + HCHT 12,5 mg | Gedeon Richter |
| perindopril + indapamid | Gleperil combi 4 mg/1,25 mg | perindopril 4 mg + indapamid 1,25 mg | Glenmark |
| | Perinalon 4 mg/1,25 mg combi | perindopril 4 mg + indapamid 1,25 mg | Sandoz |
| | Perindopril/indapamid mylan 4 mg/1,25 mg | perindopril 4 mg + indapamid 1,25 mg | Generics |
| | Perinpa 4 mg/1,25 mg | perindopril 4 mg + indapamid 1,25 mg | Ratiopharm |
| | Perinpa 8 mg/2,5 mg | perindopril 8 mg + indapamid 2,5 mg | Ratiopharm |
| | Prenewel 2 mg/0,625 mg | perindopril 2 mg + indapamid 0,625 mg | Krka |
| | Prenewel 4 mg/1,25 mg | perindopril 4 mg + indapamid 1,25 mg | Krka |
| | Prenewel 8 mg/2,5 mg | perindopril 8 mg + indapamid 2,5 mg | Krka |
| | Prestarium neo combi 5 mg/1,25 mg | perindopril 5 mg + indapamid 1,25 mg | Servier |
| | Prestarium neo combi 10 mg/2,5 mg | perindopril 10 mg + indapamid 2,5 mg | Servier |
| quinapril + hydrochlorothiazid | Accuzide 10 | quinapril 10 mg + HCHT 12,5 mg | Pfizer |
| | Accuzide 20 | quinapril 20 mg + HCHT 12,5 mg | Pfizer |
| | Quinapril/hydrochloroth. aurobindo 10 mg/12,5 mg | quinapril 10 mg + HCHT 12,5 mg | Aurobindo Pharma |
| | Quinapril/hydrochloroth. aurobindo 20 mg/12,5 mg | quinapril 20 mg + HCHT 12,5 mg | Aurobindo Pharma |
| | Stadapress 10/12,5 mg | quinapril 10 mg + HCHT 12,5 mg | Stada |
| | Stadapress 20/12,5 mg | quinapril 20 mg + HCHT 12,5 mg | Stada |
| ramipril + hydrochlorothiazid | Amprilan h 2,5 mg/12,5 mg | ramipril 2,5 mg + HCHT 12,5 mg | Krka |
| | Amprilan h 5 mg/25 mg | ramipril 5 mg + HCHT 25 mg | Krka |
| | Hartil-h 2,5/12,5 mg | ramipril 2,5 mg + HCHT 12,5 mg | Egis |
| | Hartil-h 5/25 mg | ramipril 5 mg + HCHT 25 mg | Egis |
| | Medoram plus h 2,5/12,5 mg | ramipril 2,5 mg + HCHT 12,5 mg | Medochemie |
| | Medoram plus h 5/25 mg | ramipril 5 mg + HCHT 25 mg | Medochemie |
| | Ramipril h 2,5 mg/12,5 mg actavis | ramipril 2,5 mg + HCHT 12,5 mg | Actavis |
| | Ramipril h 5 mg/25 mg actavis | ramipril 5 mg + HCHT 25 mg | Actavis |
| | Tritazide 2,5 mg/12,5 mg | ramipril 2,5 mg + HCHT 12,5 mg | Sanofi-Aventis |
| Tritazide 5 mg/25 mg | ramipril 5 mg + HCHT 25 mg | Sanofi-Aventis | |

seznamu: diuretikum thiazidového typu, BKK, ACEI nebo antagonistu receptoru pro angiotenzin II (ARB).“

Fixní trojkombinace není tak zcela novinkou, jak by se zdálo. Již v roce 1984 Spofa uvedla na trh v Československé socialistické

republice Trimecryton, což byla fixní kombinace dihydrocristinu, chlorthalidonu a metipranolu, která se s úspěchem užívala několik let. První moderní fixní trojkombinace se objevily před sedmi lety, kdy v roce 2009 byl ve Spojených státech amerických uveden na trh

Exforge HCT – kombinace valsartanu, amlodipinu a hydrochlorothiazidu, a to hned ve čtyřech různých silách [29]. V ČR byla první moderní fixní kombinace uvedena na podzim 2014 firmou Servier pod názvem **Triplixam** a jedná se o kombinaci perindopril, inda-

Tab. 4. Fixní kombinace sartanů a diuretik.

| Sartany + diuretika | | | |
|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| Kombinace | Firemní název | Obsah | Držitel registrace |
| candesartan + hydrochlorotiazid | Cancombino 16 mg/12,5 mg | candesartan 16 mg + HCHT 12,5 mg | Krka |
| | Cancombino 32 mg/12,5 mg | candesartan 32 mg + HCHT 12,5 mg | Krka |
| | Carzap hct 16 mg/12,5 mg | candesartan 16 mg + HCHT 12,5 mg | Zentiva |
| | Carzap hct 32 mg/12,5 mg | candesartan 32 mg + HCHT 12,5 mg | Zentiva |
| | Xaleec combi 8 mg/12,5 mg | candesartan 8 mg + HCHT 12,5 mg | Sandoz |
| | Xaleec combi 16 mg/12,5 mg | candesartan 16 mg + HCHT 12,5 mg | Sandoz |
| irbesartan + hydrochlorothiazid | Ifirmacombi 150 mg/12,5 mg | irbesartan 150 mg + HCHT 12,5 mg | Krka |
| | Ifirmacombi 300 mg/12,5 mg | irbesartan 300 mg + HCHT 12,5 mg | Krka |
| | Irbesartan/hydrochloroth.mylan 150 mg/12,5 mg | irbesartan 150 mg + HCHT 12,5 mg | Generics |
| | Irbesartan/hydrochloroth.mylan 300 mg/12,5 mg | irbesartan 300 mg + HCHT 12,5 mg | Generics |
| losartan + hydrochlorothiazid | Lorista h 50 mg/12,5 mg | losartan 50 mg + HCHT 12,5 mg | Krka |
| | Lorista h 100 mg/12,5 mg | losartan 100 mg + HCHT 12,5 mg | Krka |
| | Lorista h 100 mg/25 mg | losartan 100 mg + HCHT 25 mg | Krka |
| | Losagen combi 50 mg/12,5 mg | losartan 50 mg + HCHT 12,5 mg | Generics |
| | Losartan/hcht stada 50 mg/12,5 mg | losartan 50 mg + HCHT 12,5 mg | Stada |
| | Losartan/hcht stada 100 mg/25 mg | losartan 100 mg + HCHT 25 mg | Stada |
| | Loscomb 50 mg/12,5 mg | losartan 50 mg + HCHT 12,5 mg | Orion |
| | Loscomb 100 mg/25 mg | losartan 100 mg + HCHT 25 mg | Orion |
| | Lozap h | losartan 50 mg + HCHT 12,5 mg | Zentiva |
| | Sangona combi 50 mg/12,5 mg | losartan 50 mg + HCHT 12,5 mg | Sandoz |
| | Sangona combi 100 mg/25 mg | losartan 100 mg + HCHT 25 mg | Sandoz |
| telmisartan + hydrochlorothiazid | Micardisplus 80/12,5 mg | telmisartan 80 mg + HCHT 12,5 mg | Boehringer Ingelheim |
| | Micardisplus 80/25 mg | telmisartan 80 mg + HCHT 25 mg | Boehringer Ingelheim |
| | Telmark plus 80 mg/12,5 mg | telmisartan 80 mg + HCHT 12,5 mg | Glenmark |
| | Telmisartan/hydrochloroth. Egis 40 mg/12,5 mg | telmisartan 40 mg + HCHT 12,5 mg | Egis |
| | Telmisartan/hydrochloroth. Egis 80 mg/12,5 mg | telmisartan 80 mg + HCHT 12,5 mg | Egis |
| | Telmisartan/hydrochloroth. Egis 80 mg/25 mg | telmisartan 80 mg + HCHT 25 mg | Egis |
| | Telmisartan/hydrochloroth. Sandoz 80 mg/12,5 mg | telmisartan 80 mg + HCHT 12,5 mg | Sandoz |
| | Telmisartan/hydrochloroth. Sandoz 80 mg/25 mg | telmisartan 80 mg + HCHT 25 mg | Sandoz |
| | Telmisartan hctz ratio 80/12,5 mg | telmisartan 80 mg + HCHT 12,5 mg | Teva |
| | Telmizek combi 80/12,5 mg | telmisartan 80 mg + HCHT 12,5 mg | Adamed |
| | Telmizek combi 80/25 mg | telmisartan 80 mg + HCHT 25 mg | Adamed |
| | Tezeo hct 40 mg/12,5 mg | telmisartan 40 mg + HCHT 12,5 mg | Zentiva |
| | Tezeo hct 80 mg/12,5 mg | telmisartan 80 mg + HCHT 12,5 mg | Zentiva |
| | Tezeo hct 80 mg/25 mg | telmisartan 80 mg + HCHT 25 mg | Zentiva |
| | Tolucombi 40 mg/12,5 mg | telmisartan 40 mg + HCHT 12,5 mg | Krka |
| Tolucombi 80 mg/12,5 mg | telmisartan 80 mg + HCHT 12,5 mg | Krka | |
| Tolucombi 80 mg/25 mg | telmisartan 80 mg + HCHT 12,5 mg | Krka | |

Tab. 4 – pokračování. Fixní kombinace sartanů a diuretik.


| Sartany + diuretika | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------|
| Kombinace | Firemní název | Obsah | Držitel registrace |
| valsartan + hydrochlorothiazid | Blessin plus h 80/12,5 mg | valsartan 80 mg + HCHT 12,5 mg | Egis |
| | Blessin plus h 160/12,5 mg | valsartan 160 mg + HCHT 12,5 mg | Egis |
| | Blessin plus h 160/25 mg | valsartan 160 mg + HCHT 25 mg | Egis |
| | Kylotan plus h 80/12,5 mg | valsartan 80 mg + HCHT 12,5 mg | Gedeon Richter |
| | Kylotan plus h 160/12,5 mg | valsartan 160 mg + HCHT 12,5 mg | Gedeon Richter |
| | Valsacombi 80 mg/12,5 mg | valsartan 80 mg + HCHT 12,5 mg | Krka |
| | Valsacombi 160 mg/12,5 mg | valsartan 160 mg + HCHT 12,5 mg | Krka |
| | Valsacombi 160 mg/25 mg | valsartan 160 mg + HCHT 25 mg | Krka |
| | Valsacombi 320 mg/12,5 mg | valsartan 320 mg + HCHT 12,5 mg | Krka |
| | Valzap combi 80 mg/12,5 mg | valsartan 80 mg + HCHT 12,5 mg | Zentiva |
| | Valzap combi 160 mg/12,5 mg | valsartan 160 mg + HCHT 12,5 mg | Zentiva |
| | Vanatex hct 80 mg/12,5 mg | valsartan 80 mg + HCHT 12,5 mg | PWPolharma |
| | Vanatex hct 160 mg/12,5 mg | valsartan 160 mg + HCHT 12,5 mg | PWPolharma |
| | Vanatex hct 160 mg/25 mg | valsartan 160 mg + HCHT 25 mg | PWPolharma |

pamid a amlodipin [30–32]. Krátce na to uvedla podobnou trojkombinaci i firma Krka pod názvem **Tonanda**. Jediný malý rozdíl je v soli perindoprilu, kdy Servier užívá arginovou sůl s dávkováním 2,5 mg, 5 mg a 10 mg, zatímco Krka erbuminovou sůl o síle 4 a 8 mg, což v účinnosti odpovídá 5 a 10 mg argininové. Triplixam je k dispozici ve čtyřech silách (perindopril : indapamid : amlodipin):

- 5 mg : 1,25 mg : 5 mg,
- 5 mg : 1,25 mg : 10 mg,
- 10 mg : 2,5 mg : 5 mg,
- 10 mg : 2,5 mg : 10 mg.

Tonanda je ve stejných silách (resp. rozdíl v soli perindoprilu), ale síly jsou udány v jiném pořadí, a to perindopril : amlodipin : indapamid.

Perindopril je inhibitor angiotenzin konvertujícího enzymu s dlouhým trváním účinku. Jeho působením dochází k inhibici konverze neúčinného angiotenzinu I na angiotenzin II (s významným vazokonstrikčním účinkem), ke zpomalení degradace bradykininu (s vazodilatačním účinkem) a k poklesu sekrece aldosteronu. Snížením plazmatické hladiny angiotenzinu II a inhibicí degradace bradykininu dochází k významnému poklesu periferní cévní rezistence, snížení sekrece aldosteronu brání retenci natria a vody. Perindopril je sám neúčinná látka (prodrug) a přeměňuje se v organismu hydrolyzou na aktivní perindoprilát. Ostatní metabolity jsou inaktivní. Maximálního antihypertenzního účinku je dosaženo



Obr. 6. Snížení mortality v klinických studiích u hypertenze.

za 4–6 hod po podání a přetrvává nejméně 24 hod. Plného účinku se dosahuje asi v průběhu čtyř týdnů. Při dlouhodobém podávání se prokázal vliv perindoprilu na snížení hypertrofie jak srdeční stěny, tak i stěn velkých cév spolu se zvýšením jejich elasticity.

Amlodipin je antagonist kalcia (blokátor pomalého kalciového kanálu) dihydropyridinového typu s výraznou vazodilatační aktivitou a s velmi dlouhodobým účinkem. Základním účinkem je relaxace hladké svaloviny zejména

na úrovni epikardiální části koronárního řečiště (postiženém aterosklerózou i intaktním). Vzhledem k výrazné relaxaci i na úrovni arteriol je vhodný k léčbě arteriální hypertenze, ke snížení afterloadu při námahové angině pectoris a při srdečním selhání. Výhodný je minimální efekt na kontraktilitu myokardu, převodní systém a AV uzel. Po perorálním podání je amlodipin pomalu resorbován (maximální hladiny v plazmě je dosaženo za 6–12 hod). Biologická dostupnost je asi 60–80 %, meta-

bolizován je v játrech na inaktivní metabolity. V plazmě je převážně vázán na proteiny, eliminační poločas je velmi dlouhý, 35–50 hod.

Indapamid je derivát sulfonamidů s indolovým kruhem, farmakologicky podobný thiazidovým diuretikům, který působí inhibicí reabsorpce sodíku v dilučním segmentu kůry. Zvyšuje vylučování sodíku a chloridů močí a v menší míře i vylučování draslíku a hořčíku, čímž zvyšuje objem vytvořené moči. TK snižuje především relaxací arterio, diuretický účinek je spíše menší. Indapamid se po perorálním podání dobře absorbuje, biologická dostupnost je vysoká (93 %), maximální koncentrace v plazmě se dosahuje během 1–2 hod. Více než 75 % se váže na proteiny v plazmě. Poločas plazmatické eliminace je 14–24 hod. Opakované podávání zvyšuje ustálený stav plazmatické koncentrace v porovnání s jednorázově podanou dávkou.

Všechny tři preparáty v uvedené fixní kombinaci mají spíše pomalejší nástup účinku s minimálně 24hodinovým působením, a jsou tedy vhodné k dlouhodobé léčbě hypertenze a splňují JNC, ESC i ČKS doporučení na kombinaci ACEI, dihydropyridin a diuretikum [1,2,28].

Závěr

Kombináční léčba hypertenze je dnes základem pro dobrou kontrolu TK. Více než 20 % hypertoniků potřebuje kombinaci minimálně tří antihypertenziv, za vhodnou je považována především kombinace ACEI + dihydropyridin + diuretikum. Použití fixních kombinací výrazně zlepšuje adherenci a compliance k léčbě, což vede k účinnější kontrole TK. Na podzim roku 2014 byla v ČR registrována první fixní trojkombinace antihypertenziv, a to perindopril + indapamid + amlodipin.

Literatura

- Filipovský J, Widimský J jr, Ceral J et al. Diagnostické a léčebné postupy u arteriální hypertenze, verze 2012: Doporučení České společnosti pro hypertenzi. Vnitř Lék 2012; 58: 785–801.
- Mancia G, Fagard R, Narkiewicz K et al. 2013 ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension. J Hypertens 2013; 31: 1281–1357. doi: 10.1097/01.hjh.0000431740.32696.cc.
- Wolf-Maier K, Cooper RS, Banegas JR et al. Hypertension prevalence and blood pressure levels in 6 European countries, Canada, and the United States. JAMA 2003; 289: 2363–2369.
- Cífková R, Škodová Z, Bruthans J et al. Longitudinal trends in cardiovascular mortality and blood pressure levels, prevalence, awareness, treatment, and control of hypertension in the Czech population from 1985 to 2007/2008. J Hypertens 2010; 28: 2196–2203. doi: 10.1097/HJH.0b013e32833d4451.
- Bramlage P, Bohm M, Volpe M et al. A global perspective on blood pressure treatment and control in a referred cohort of hypertensive patients. J Clin Hypertens 2010; 12: 666–677. doi: 10.1111/j.1751-7176.2010.00322.x.
- Wald DS, Law M, Morris JK et al. Combination therapy versus monotherapy in reducing blood pressure: meta-analysis on 11,000 participants from 42 trials. Am J Med 2009; 122: 290–300. doi: 10.1016/j.amjmed.2008.09.038.
- Dahlöf B, Sever PS, Poulter NR et al. The ASCOT Investigators. Prevention of cardiovascular events with an antihypertensive regimen of amlodipine adding perindopril as required versus atenolol adding bendroflumethiazide as required, in the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial-Blood Pressure Lowering Arm (ASCOT-BPLA): a multicentre randomised controlled trial. Lancet 2005; 366: 895–906.
- Kettani FZ, Dragomir A, Côté R et al. Impact of a better adherence to antihypertensive agents on cerebrovascular disease for primary prevention. Stroke 2009; 40: 213–220. doi: 10.1161/STROKEAHA.108.522193.
- Peters R, Beckett N, Forre F et al. Incident dementia and blood pressure lowering in the Hypertension in Very Elderly Trial cognitive function assessment. Lancet Neurol 2008; 7: 683–689. doi: 10.1016/S1474-4422(08)70143-1.
- Mancia G, Laurent S, Agabiti-Rosei E et al. Reappraisal of European guidelines on hypertension management: a European Society of Hypertension Task Force document. J Hypertens 2009; 27: 2121–2258. doi: 10.1097/HJH.0b013e328333146d.
- Bangalore S, Kamalakkannan G, Parkar S et al. Fixed-dose combinations improve medication compliance: a meta-analysis. Am J Med 2007; 120: 713–719.
- Vitovec J, Špinar J. Kombináční léčba hypertenze s přihlédnutím k fixním kombinacím. Kardiol Rev Int Med 2014; 16: 71–74.
- Špinar J, Vitovec J. Kombináční léčba hypertenze. Causa Subita 2012; 15: 10–13.
- Souček M, Řiháček I. Léčba hypertenze v rámci metabolického syndromu. Kardiol Rev Int Med 2010; 12: 73–76.
- Nissen SE, Tuzcu EM, Libby P et al. Effect of antihypertensive agents on cardiovascular events in patients with coronary disease and normal blood pressure: the CAMELOT study: a randomized controlled trial. JAMA 2004; 292: 2217–2225.
- Tatti P, Pahor M, Byington RP et al. Outcome results of the Fosinopril Versus Amlodipine Cardiovascular Events Randomized Trial (FACET) in patients with hypertension and NIDDM. Diabetes Care 1998; 21: 597–603.
- Tobe S, Kawecka-Jaszcz K, Zannad F et al. Amlodipine added to quinapril vs quinapril alone for the treatment of hypertension in diabetes: the Amlodipine in Diabetes (ANDI) trial. J Clin Hypertens (Greenwich) 2007; 9: 120–127.
- Dahlöf B, Sever PS, Poulter NR et al. Prevention of cardiovascular events with an antihypertensive regimen of amlodipine adding perindopril as required versus atenolol adding bendroflumethiazide as required, in the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial-Blood Pressure Lowering Arm (ASCOT-BPLA): a multicentre randomised controlled trial. Lancet 2005; 366: 895–906.
- Poulter NR, Wedel H, Dahlöf B et al. Role of blood pressure and other variables in the differential cardiovascular event rates noted in the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial-Blood Pressure Lowering Arm (ASCOT-BPLA). Lancet 2005; 366: 907–913.
- Jamerson K, Weber MA, Bakris GL et al. Benazepril plus amlodipine or hydrochlorothiazide for hypertension in high-risk patients. N Engl J Med 2008; 359: 2417–2428. doi: 10.1056/NEJMoa0806182.
- Bakris GL, Sarafidis PA, Weir MR et al. Renal outcomes with different fixed-dose combination therapies in patients with hypertension at high risk for cardiovascular events (ACCOMPLISH): a prespecified secondary analysis of a randomised controlled trial. Lancet 2010; 375: 1173–1181. doi: 10.1016/S0140-6736(09)62100-0.
- Vitovec J, Špinar J. Perindopril/indapamid – fixní kombinace. Remedia 2007; 17: 247–257.
- van Vark LC, Bertrand M, Akkerhuis KM et al. Angiotensin-converting enzyme inhibitors reduce mortality in hypertension: a meta-analysis of randomized clinical trials of renin-angiotensin-aldosterone system inhibitors involving 158 998 patients. Eur Heart J 2012; 33: 2088–2097. doi: 10.1093/eurheartj/ehs075.
- Patel A, MacMahon S, Chalmers J et al. ADVANCE Collaborative Group. Effects of a fixed combination of perindopril and indapamide on macrovascular and microvascular outcomes in patients with type 2 diabetes mellitus (the ADVANCE trial): a randomised controlled trial. Lancet 2007; 370: 829–840.
- Gradman AH, Acevedo C. Evolving strategies for the use of combination therapy in hypertension. Curr Hypertens Rep 2002; 4: 343–349.
- Špinar J, Vitovec J. Kombináční léčba hypertenze. Causa Subita 2012; 15: 10–13.
- Hess G, Hill J, Lau H et al. Medication utilization patterns and hypertension-related expenditures among patients who were switched from fixed-dose to free-combination antihypertensive therapy. P T 2008; 33: 652–666.
- James PA, Oparil S, Carter BL et al. 2014 Evidence-based guideline for the management of high blood pressure in adults: report from the panel members appointed to the Eighth Joint National Committee (JNC 8). JAMA 2014; 311: 507–520. doi: 10.1001/jama.2013.284427.
- Deeks ED. Amlodipine/valsartan/hydrochlorothiazide: fixed-dose combination in hypertension. Am J Cardiovasc Drugs 2009; 9: 411–418. doi: 10.2165/11204350-000000000-00000.
- Widimský J jr. První fixní trojkombinace perindopril arginin-indapamid-amlodipin: nový přístup v kombináční léčbě hypertenze. Vnitř Lék 2014; 60: 801–807.
- Widimský J jr. Trojkombinace v léčbě hypertenze. Kardiol Rev Int Med 2014; 16: 449–453.
- Widimský J jr. Na český trh přichází vůbec první fixní antihypertenzní trojkombinace. Practicus 2014; 8: 29.

Doručeno do redakce: 29. 3. 2016

Přijato po recenzi: 11. 4. 2016

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC
www.fnbrno.cz
spinar.jindrich@fnbrno.cz